MAHAIE.BE - HAIE SI ON PLANTAIT?

Fiches descriptives d'espèces indigènes présentes dans les haies et autres éléments agroforestiers

Avec le soutien de la Wallonie

AWAF asbl
Association pour l'agroforesterie en Wallonie et à Bruxelles



L'AWAF asbl

L'AWAF asbl a été créée en 2012 sous l'impulsion du groupe de travail « agroforesterie » du Réseau wallon de développement rural. Regroupant propriétaires et/ou agriculteurs, chercheurs, entrepreneurs, enseignants, représentants des administrations, l'asbl rassemble toutes les personnes intéressées par les techniques agroforestières et souhaitant disposer d'un état des lieux de la situation agroforestière en Wallonie.
Depuis sa création, l'AWAF est consultée par les associations et administrations.

AWAF asbl
Association pour l'agroforesterie
en Wallonie et à Bruxelles

REMERCIEMENTS

Le présent document a été réalisé dans le cadre du projet « Haies multifonctionnelles », financé par le SPW DGO3.

Ce projet a été réalisé grâce au soutien de la Wallonie, Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Les auteurs remercient le comité d'accompagnement, ainsi que les nombreuses personnes qui ont accordé du temps à ce projet. Ce travail est le fruit de rencontres, d'échanges et de collaborations régionales et transfrontalières.

Avec le soutien de la
Wallonie

SOMMAIRE

Essence = Essence distribuée lors de la St-Catherine 2026 à Remicourt

HAUTS-JETS

Alisier blanc - *Sorbus aria*

Alisier torminal - *Sorbus torminalis*

Aulne glutineux - *Alnus glutinosa*

Bouleau pubescent - *Betula pubescens*

Bouleau verruqueux - *Betula pendula*

Charme - *Carpinus betulus*

Châtaignier - *Castanea sativa*

Chêne pédonculé - *Quercus robur*

Chêne sessile - *Quercus petraea*

Erable champêtre - *Acer campestre*

Erable plane - *Acer platanoides*

Erable sycomore - *Acer pseudoplatanus*

Hêtre commun - *Fagus sylvatica*

Merisier - *Prunus avium*

Noyer commun - *Juglans regia*

Noyer hybride - *Juglans Regia x Nigra*

Orme champêtre - *Ulmus minor*

Orme des montagnes - *Ulmus glabra*

Peuplier blanc - *Populus alba*

Peuplier grisard - *Populus canescens*

Peuplier tremble - *Populus tremula*

Poirier sauvage - *Pyrus pyraster*

Pommier sauvage - *Malus sylv. Sylvestris*

Saule blanc - *Salix alba*

Saule fragile - *Salix fragilis*

Saule marsault - *Salix caprea*

Sorbier des oiseleurs - *Sorbus aucuparia*

Tilleul à grandes feuilles - *Tilia platyphyllos*

Tilleul à petites feuilles - *Tilia cordata*

ARBUSTES

Aubépine à 1 style - *Crateagus monogyna*

Aubépine à 2 styles - *Crateagus laevigata*

Bourdaine - *Frangula alnus*

Cerisier à grappes - *Prunus padus*

Cognassier - *Cydonia oblonga*

Cornouiller mâle - *Cornus mas*

Cornouiller sanguin - *Cornus sanguinea*

Eglantier - *Rosa canina*

Framboisier - *Rubus idaeus*

Fusain d'Europe - *Euonymus europaeus*

Genêt à balais - *Cytisus scoparius*

Griottier - *Prunus cerasus*

Groseillier à maquereaux - *Ribes uva-crispa*

Groseillier noir (cassis) - *Ribes nigrum*

Groseillier rouge - *Ribes rubrum*

Houx - *Ilex aquifolium*

Nèflier - *Mespilus germanica*

Nerprun purgatif - *Rhamnus cathartica*

Noisetier - *Corylus avellana*

Prunelier - *Prunus spinosa*

Saule cendré - *Salix cinerea*

Saule des vanniers - *Salix viminalis*

Saule pourpre - *Salix purpurea*

Sureau à grappes -*Sambucus racemosa*

Sureau noir - *Sambucus nigra*

Troène commun - *Ligustrum vulgare*

Viorne lantane - *Viburnum lantana*

Viorne obier - *Viburnum opulus*

Zones bioclimatiques compatibles



SORBUS ARIA - ALISIER BLANC OU ALOUCHIER
(ROSACÉES)

CARACTÉRISTIQUES

- **Hauteur à terme :** 15-20m
- **Envergure :** 5-10m
- **Vitesse de croissance en hauteur :** faible
- **Persistance :** non
- **Forme :** haut-jet | arbuste | cépée | têtard | haie basse taillée

ECOLOGIE

- **Zones bioclimatiques compatibles :** partout; spontané en Haute-Ardenne
- **Précipitations annuelles totales :** non déterminé
- **Température annuelle moyenne :** espèce thermophile
- **Floraison :** mai-juin
- **Fructification :** septembre-octobre
- **Espèce entomophile :** oui | non

Niveau hydrique	Niveau trophique						
	AA	A	aa	a	n	b
XX	■	■	■	■	■	■
X	■	■	■	■	■	■
m						
f						
h						
hh						
H						

AA : *très acide /* ***A :*** *acide /* ***aa :*** *assez acide /* ***a :*** *faiblement acide /* ***n :*** *neutre /* ***b :*** *calcaire*
XX : *très sec /* ***X :*** *sec /* ***m :*** *mésophile /* ***f :*** *frais /* ***h :*** *assez humide /* ***hh :*** *humide /* ***H :*** *mouillé-inondé*








ALISIER BLANC

Zones bioclimatiques compatibles



BETULA PENDULA - BOULEAU VERRUQUEUX
(BÉTULACÉES)

CARACTÉRISTIQUES
- **Hauteur à terme :** 20-25m
- **Envergure :** 10m
- **Vitesse de croissance en hauteur :** élevée
- **Persistance :** non
- **Forme :** haut-jet | arbuste | cépée | têtard | haie basse taillée

ECOLOGIE
- **Zones bioclimatiques compatibles :** partout
- **Précipitations annuelles totales :** 500mm
- **Température annuelle moyenne :** non déterminé
- **Floraison :** châtons pendants ; avril-mai
- **Fructification :** cônes pendants se désagrégant sur l'arbre ; juillet-août
- **Espèce entomophile :** oui | non


DIVERS
- **Intérêt en haie :** dans les haies brise-vents et au besoin de croissance rapide
- **Autre(s) caractéristique(s) :** espèce pionnière

Niveau hydrique	Niveau trophique AA	A	aa	a	n	b
XX	■	■	■	■	■	■
X	■	■	■	■	■	■
m	■	■	■	■	■	■
f	■	■	■	■	■	■
h	■	■	■	■	■	■
hh	■	■	■	■	■	■
H						

AA : *très acide /* ***A :*** *acide /* ***aa :*** *assez acide /* ***a :*** *faiblement acide /* ***n :*** *neutre /* ***b :*** *calcaire*
XX : *très sec /* ***X :*** *sec /* ***m :*** *mésophile /* ***f :*** *frais /* ***h :*** *assez humide /* ***hh :*** *humide /* ***H :*** *mouillé-inondé*








Accéder à la fiche détaillée du « fichier écologique des essences »

BOULEAU VERRUQUEUX

Zones bioclimatiques compatibles



FRANGULA ALNUS - BOURDAINE
(RHAMNACÉES)

CARACTÉRISTIQUES
- **Hauteur à terme :** 1-5m
- **Envergure :** 2-3m
- **Vitesse de croissance en hauteur :** moyenne en conditions de plein découvert
- **Persistance :** non
- **Forme :** haut-jet | **arbuste** | **cépée** | têtard | **haie basse taillée**

ECOLOGIE
- **Zones bioclimatiques compatibles :** partout (pas optimal en Haute et Basse Lorraine)
- **Précipitations annuelles totales :** non déterminé
- **Température annuelle moyenne :** non déterminé
- **Floraison :** avril-juillet
- **Fructification :** petites drupes rouges puis noires, juillet-octobre
- **Espèce entomophile :** **oui** | non

DIVERS
- **Intérêt en haie :** intérêt pour la faune
- **Autre(s) caractéristique(s) :** héliophile
- **Précautions** : fruits (et écorces) toxiques pour l'homme





Niveau hydrique	Niveau trophique						
	AA	A	aa	a	n	b
XX						
X						
m						
f						
h	■	■	■			
hh	■	■	■			
H	■	■	■			


AA : *très acide /* ***A :*** *acide /* ***aa :*** *assez acide /* ***a :*** *faiblement acide /* ***n :*** *neutre /* ***b :*** *calcaire*
XX : *très sec /* ***X :*** *sec /* ***m :*** *mésophile /* ***f :*** *frais /* ***h :*** *assez humide /* ***hh :*** *humide /* ***H :*** *mouillé-inondé*



BOURDAINE

PRUNUS PADUS - CERISIER À GRAPPES
(ROSACÉES)

Zones bioclimatiques compatibles





CARACTÉRISTIQUES

- **Hauteur à terme :** 10-15m
- **Envergure :** 5-10m
- **Vitesse de croissance en hauteur :** moyenne
- **Persistance :** non
- **Forme :**

haut-jet	arbuste	cépée	têtard	haie basse taillée

ECOLOGIE

- **Zones bioclimatiques compatibles :** partout sauf Haute-Ardenne et Ardenne centro-orientale
- **Précipitations annuelles totales :** non déterminé
- **Température annuelle moyenne :** non déterminé
- **Floraison :** fleurs blanches en racèmes pendants de 10-15cm ; avril-juin
- **Fructification :** petites drupes noires ; juin-août
- **Espèce entomophile :**

oui	non

DIVERS

- **Intérêt en haie :** intérêt mellifère et pour l'avifaune ; développement dans les sols humides
- **Autre(s) caractéristique(s) :** tolérance à l'engorgement en eau




Niveau hydrique	Niveau trophique					
	AA	A	aa	a	n	b
XX						
X				■	■	
m				■	■	
f			■	■	■	
h			■	■	■	
hh			■	■	■	
H						



AA : *très acide /* ***A :*** *acide /* ***aa :*** *assez acide /* ***a :*** *faiblement acide /* ***n :*** *neutre /* ***b :*** *calcaire*
XX : *très sec /* ***X :*** *sec /* ***m :*** *mésophile /* ***f :*** *frais /* ***h :*** *assez humide /* ***hh :*** *humide /* ***H :*** *mouillé-inondé*

CERISIER À GRAPPES

Zones bioclimatiques compatibles



CASTANEA SATIVA - CHÂTAIGNIER
(FAGACÉES)



CARACTÉRISTIQUES
- **Hauteur à terme :** 25m
- **Envergure :** 15m
- **Vitesse de croissance en hauteur :** élevée
- **Persistance :** non
- **Forme :** haut-jet | arbuste | cépée | têtard | haie basse taillée

ECOLOGIE
- **Zones bioclimatiques compatibles :** Haute et Basse Lorraine ; Fagne/Famenne/Calestienne (pas optimal) ; Plaines et vallées scaldisiennes ; Hesbino-brabançon ; Sambre-et-Meuse et Condroz
- **Précipitations annuelles totales :** min 700mm
- **Température annuelle moyenne :** 8-15°C
- **Floraison :** longs châtons dressés ; juin-juillet
- **Fructification :** châtaignes comestibles (variétés multiples) ; septembre-octobre
- **Espèce entomophile :** oui | non

DIVERS
- **Intérêt en haie :** espèce envisageable pour les taillis linéaires ; production de fruits
- **Autre(s) caractéristique(s) :** sensible à la compaction des sols ainsi qu'à l'engorgement temporaire en eau



Niveau hydrique	Niveau trophique						
	AA	A	aa	a	n	b
XX						
X						
m	■	■	■			
f	■	■	■			
h						
hh						
H						



© Jean Marot


AA : *très acide /* ***A :*** *acide /* ***aa :*** *assez acide /* ***a :*** *faiblement acide /* ***n :*** *neutre /* ***b :*** *calcaire*
XX : *très sec /* ***X :*** *sec /* ***m :*** *mésophile /* ***f :*** *frais /* ***h :*** *assez humide /* ***hh :*** *humide /* ***H :*** *mouillé-inondé*

Accéder à la fiche détaillée du « fichier écologique des essences »

CHÂTAIGNIER

RUBUS IDAEUS - FRAMBOISIER
(ROSACÉES)

Zones bioclimatiques compatibles



CARACTÉRISTIQUES
- **Hauteur à terme :** 1-2m
- **Envergure :** 1m
- **Vitesse de croissance en hauteur :** soutenue
- **Persistance :** non
- **Forme :** haut-jet | **arbuste** | **cépée** | têtard | **haie basse taillée**

ECOLOGIE
- **Zones bioclimatiques compatibles :** partout
- **Précipitations annuelles totales :** non déterminé
- **Température annuelle moyenne :** non déterminé
- **Floraison :** mai-août
- **Fructification :** framboise ; juin à octobre
- **Espèce entomophile :** **oui** | non

DIVERS
- **Intérêt en haie :** intérêt pour la faune
- **Autre(s) caractéristique(s) :** fruits comestibles





		Niveau trophique					
		AA	A	aa	a	n	b
Niveau hydrique	XX						
	X	■	■	■	■	■	■
	m	■	■	■	■	■	■
	f	■	■	■	■	■	■
	h						
	hh						
	H						




AA : *très acide /* ***A :*** *acide /* ***aa :*** *assez acide /* ***a :*** *faiblement acide /* ***n :*** *neutre /* ***b :*** *calcaire*
XX : *très sec /* ***X :*** *sec /* ***m :*** *mésophile /* ***f :*** *frais /* ***h :*** *assez humide /* ***hh :*** *humide /* ***H :*** *mouillé-inondé*

FRAMBOISIER

EUNOYMUS EUROPAEUS - FUSAIN D'EUROPE
(CÉLASTRACÉES)

Zones bioclimatiques compatibles



CARACTÉRISTIQUES
- **Hauteur à terme :** 2-6m
- **Envergure :** 2-3m
- **Vitesse de croissance en hauteur :** lente
- **Persistance :** non
- **Forme :** haut-jet | **arbuste** | **cépée** | têtard | **haie basse taillée**

ECOLOGIE
- **Zones bioclimatiques compatibles :** partout sauf en Ardenne
- **Précipitations annuelles totales :** non déterminé
- **Température annuelle moyenne :** non déterminé
- **Floraison :** avril-mai
- **Fructification :** capsule à quatre loges ; automne
- **Espèce entomophile :** **oui** | non


DIVERS
- **Intérêt en haie :** espèce d'accompagnement ; esthétique
- **Autre(s) caractéristique(s) :** plante vomitive et purgative
- **Précautions** : fruits toxiques pour l'homme





Niveau hydrique	Niveau trophique						
	AA	A	aa	a	n	b
XX						
X			■	■	■	■
m			■	■	■	■
f			■	■	■	■
h			■	■	■	■
hh			■	■	■	■
H						


AA : *très acide /* ***A :*** *acide /* ***aa :*** *assez acide /* ***a :*** *faiblement acide /* ***n :*** *neutre /* ***b :*** *calcaire*
XX : *très sec /* ***X :*** *sec /* ***m :*** *mésophile /* ***f :*** *frais /* ***h :*** *assez humide /* ***hh :*** *humide /* ***H :*** *mouillé-inondé*



FUSAIN D'EUROPE

CORYLUS AVELLANA - NOISETIER
(CORYLACÉES)

Zones bioclimatiques compatibles





CARACTÉRISTIQUES
- **Hauteur à terme :** 2-5m
- **Envergure :** 2-5m
- **Vitesse de croissance en hauteur :** élevée
- **Persistance :** non
- **Forme :** haut-jet | **arbuste** | **cépée** | têtard | **haie basse taillée**

ECOLOGIE
- **Zones bioclimatiques compatibles :** partout
- **Précipitations annuelles totales :** non déterminé
- **Température annuelle moyenne :** non déterminé
- **Floraison :** janvier à mars
- **Fructification :** noisette ; automne
- **Espèce entomophile :** **oui** | non



DIVERS
- **Intérêt en haie :** mellifère précoce ; noisettes comestibles (attention au choix des variétés)
- **Autre(s) caractéristique(s) :** floraison précoce ; bois tendre et souple



Niveau hydrique	Niveau trophique						
		AA	A	aa	a	n	b
	XX						
	X		■	■	■	■	■
	m		■	■	■	■	■
	f		■	■	■	■	■
	h		■	■	■	■	■
	hh		■	■	■	■	■
	H						




AA : *très acide /* ***A :*** *acide /* ***aa :*** *assez acide /* ***a :*** *faiblement acide /* ***n :*** *neutre /* ***b :*** *calcaire*
XX : *très sec /* ***X :*** *sec /* ***m :*** *mésophile /* ***f :*** *frais /* ***h :*** *assez humide /* ***hh :*** *humide /* ***H :*** *mouillé-inondé*

NOISETIER

PEUPLIER BLANC

Zones bioclimatiques compatibles



POPULUS ALBA - PEUPLIER BLANC
(SALICACÉES)



CARACTÉRISTIQUES
- **Hauteur à terme :** 20-30m
- **Envergure :** 12m
- **Vitesse de croissance en hauteur :** soutenue
- **Persistance :** non
- **Forme :** haut-jet | arbuste | cépée | têtard | haie basse taillée

ECOLOGIE
- **Zones bioclimatiques compatibles :** partout sauf Haute Ardenne et Ardenne centro-orientale
- **Précipitations annuelles totales :** non déterminé mais large amplitude
- **Température annuelle moyenne :** non déterminé mais large amplitude
- **Floraison :** mars-avril
- **Fructification :** capsule à graines cotonneuses ; mars-avril
- **Espèce entomophile :** oui | non

DIVERS
- **Intérêt en haie :** couleur blanche ornementale
- **Autre(s) caractéristique(s) :** supporte les sols secs et le vent

Niveau hydrique	Niveau trophique AA	A	aa	a	n	b
XX				■	■	■
X				■	■	■
m				■	■	■
f				■	■	■
h				■	■	■
hh				■	■	■
H						


AA : *très acide /* ***A :*** *acide /* ***aa :*** *assez acide /* ***a :*** *faiblement acide /* ***n :*** *neutre /* ***b :*** *calcaire*
XX : *très sec /* ***X :*** *sec /* ***m :*** *mésophile /* ***f :*** *frais /* ***h :*** *assez humide /* ***hh :*** *humide /* ***H :*** *mouillé-inondé*





PYRUS PYRASTER - POIRIER SAUVAGE
(ROSACÉES)

Zones bioclimatiques compatibles





© ASBL Centre de Michamps

CARACTÉRISTIQUES

- **Hauteur à terme :** 8-20m
- **Envergure :** 6m
- **Vitesse de croissance en hauteur :** lente
- **Persistance :** non
- **Forme :** haut-jet | arbuste | cépée | têtard | haie basse taillée

ECOLOGIE

- **Zones bioclimatiques compatibles :** partout sauf Haute Ardenne et Ardenne centro-orientale
- **Précipitations annuelles totales :** min 600mm
- **Température annuelle moyenne :** min 7°C
- **Floraison :** avril-mai
- **Fructification :** poire ; septembre
- **Espèce entomophile :** oui | non

DIVERS

- **Intérêt en haie :** intérêt biologique élevé ; bois de qualité
- **Autre(s) caractéristique(s) :** bois de qualité ; résistant à la sécheresse ; très héliophile et sensible à l'engorgement en eau du sol



© ASBL Centre de Michamps



© ASBL Centre de Michamps



© ASBL Centre de Michamps

Niveau hydrique	Niveau trophique						
	AA	A	aa	a	n	b
XX						
X			■	■	■	■
m			■	■	■	■
f			■	■	■	■
h			■	■	■	■
hh						
H						


AA : *très acide /* ***A :*** *acide /* ***aa :*** *assez acide /* ***a :*** *faiblement acide /* ***n :*** *neutre /* ***b :*** *calcaire*
XX : *très sec /* ***X :*** *sec /* ***m :*** *mésophile /* ***f :*** *frais /* ***h :*** *assez humide /* ***hh :*** *humide /* ***H :*** *mouillé-inondé*

Accéder à la fiche détaillée du « fichier écologique des essences »

POIRIER SAUVAGE

MALUS SYLVESTRIS - POMMIER SAUVAGE
(ROSACÉES)

Zones bioclimatiques compatibles





© ASBL Centre de Michamps

CARACTÉRISTIQUES

- **Hauteur à terme :** 6-10m
- **Envergure :** 5m
- **Vitesse de croissance en hauteur :** lente
- **Persistance :** non
- **Forme :** haut-jet | arbuste | cépée | têtard | haie basse taillée

ECOLOGIE

- **Zones bioclimatiques compatibles :** partout
- **Précipitations annuelles totales :** min 600mm
- **Température annuelle moyenne :** min 7°C
- **Floraison :** avril-mai
- **Fructification :** pomme ; septembre
- **Espèce entomophile :** oui | non

DIVERS

- **Intérêt en haie :** intérêt biologique élevé ; bois de qualité
- **Autre(s) caractéristique(s) :** bois de qualité et peu sensible aux conditions climatiques ; très héliophile et sensible à l'engorgement en eau du sol



© ASBL Centre de Michamps



© ASBL Centre de Michamps



© ASBL Centre de Michamps

Niveau hydrique	Niveau trophique						
	AA	A	aa	a	n	b
XX						
X		■	■	■	■	■
m		■	■	■	■	■
f		■	■	■	■	■
h		■	■	■	■	■
hh						
H						


AA : *très acide /* ***A :*** *acide /* ***aa :*** *assez acide /* ***a :*** *faiblement acide /* ***n :*** *neutre /* ***b :*** *calcaire*
XX : *très sec /* ***X :*** *sec /* ***m :*** *mésophile /* ***f :*** *frais /* ***h :*** *assez humide /* ***hh :*** *humide /* ***H :*** *mouillé-inondé*

Accéder à la fiche détaillée du « fichier écologique des essences »

POMMIER SAUVAGE

SAULE DES VANNIERS

Zones bioclimatiques compatibles





SALIX VIMINALIS - SAULE DES VANNIERS
(SALICACÉES)

CARACTÉRISTIQUES
- **Hauteur à terme :** 3-10m
- **Envergure :** 5m
- **Vitesse de croissance en hauteur :** très soutenue
- **Persistance :** non
- **Forme :** haut-jet | **arbuste** | **cépée** | **têtard** | **haie basse taillée**

ECOLOGIE
- **Zones bioclimatiques compatibles :** partout sauf Haute-Ardenne et Ardenne Centro-orientale
- **Précipitations annuelles totales :** non déterminé
- **Température annuelle moyenne :** non déterminé
- **Floraison :** (mars)-avril-mai
- **Fructification :** capsule tomenteuse soyeuse, sessile ou subsessile ; avril-mai-juin
- **Espèce entomophile :** **oui** | non

DIVERS
- **Intérêt en haie :** mellifère précoce ; appétence élevée par la faune
- **Autre(s) caractéristique(s) :** espèce pionnière






Niveau hydrique	Niveau trophique						
	AA	A	aa	a	n	b
XX						
X						
m			■	■	■	■
f			■	■	■	■
h			■	■	■	■
hh			■	■	■	■
H						

AA : *très acide /* ***A :*** *acide /* ***aa :*** *assez acide /* ***a :*** *faiblement acide /* ***n :*** *neutre /* ***b :*** *calcaire*
XX : *très sec /* ***X :*** *sec /* ***m :*** *mésophile /* ***f :*** *frais /* ***h :*** *assez humide /* ***hh :*** *humide /* ***H :*** *mouillé-inondé*



SALIX CAPREA - SAULE MARSAULT
(SALICACÉES)

Zones bioclimatiques compatibles





CARACTÉRISTIQUES
- **Hauteur à terme :** 3-15m
- **Envergure :** 10m
- **Vitesse de croissance en hauteur :** très soutenue
- **Persistance :** non
- **Forme :**

haut-jet	arbuste	cépée	têtard	haie basse taillée

ECOLOGIE
- **Zones bioclimatiques compatibles :** partout
- **Précipitations annuelles totales :** non déterminé
- **Température annuelle moyenne :** non déterminé
- **Floraison :** (février)-mars-avril
- **Fructification :** capsule tomenteuse ; avril-mai
- **Espèce entomophile :**

oui	non







DIVERS
- **Intérêt en haie :** mellifère précoce
- **Autre(s) caractéristique(s) :** espèce pionnière ; parfois envahissant


Niveau hydrique	Niveau trophique						
		AA	A	aa	a	n	b
	XX						
	X		■	■	■	■	■
	m		■	■	■	■	■
	f		■	■	■	■	■
	h		■	■	■	■	■
	hh		■	■	■	■	■
	H						

AA : *très acide /* ***A :*** *acide /* ***aa :*** *assez acide /* ***a :*** *faiblement acide /* ***n :*** *neutre /* ***b :*** *calcaire*
XX : *très sec /* ***X :*** *sec /* ***m :*** *mésophile /* ***f :*** *frais /* ***h :*** *assez humide /* ***hh :*** *humide /* ***H :*** *mouillé-inondé*

SAULE MARSAULT

VIBURNUM LANTANA - VIORNE LANTANE
(CAPRIFOLIACÉES)

Zones bioclimatiques compatibles





CARACTÉRISTIQUES
- **Hauteur à terme :** 1-3m
- **Envergure :** 1-3m
- **Vitesse de croissance en hauteur :** lente
- **Persistance :** non
- **Forme :** haut-jet | **arbuste** | **cépée** | têtard | **haie basse taillée**

ECOLOGIE
- **Zones bioclimatiques compatibles :** Haute et Basse Lorraine ; Thiérache ; Sambre-et-Meuse et Condroz ; Fagne/Famenne/Calestienne
- **Précipitations annuelles totales :** non déterminé
- **Température annuelle moyenne :** non déterminé
- **Floraison :** mai-juin
- **Fructification :** drupe ovoïde ; automne
- **Espèce entomophile :** **oui** | non

DIVERS
- **Intérêt en haie :** biodiversité





Niveau hydrique	Niveau trophique						
	AA	A	aa	a	n	b
XX						
X				■	■	■
m				■	■	■
f				■	■	■
h				■	■	■
hh				■	■	■
H						

AA : *très acide /* ***A :*** *acide /* ***aa :*** *assez acide /* ***a :*** *faiblement acide /* ***n :*** *neutre /* ***b :*** *calcaire*
XX : *très sec /* ***X :*** *sec /* ***m :*** *mésophile /* ***f :*** *frais /* ***h :*** *assez humide /* ***hh :*** *humide /* ***H :*** *mouillé-inondé*

VIORNE LANTANE